Atelier thématique THEIA

Le paludisme forestier au Myanmar : identification des paysages forestiers à risque dans une diversité d'environnements

Eva Legendre

Doctorante en 3^{ème} année au SESSTIM, équipe QuantIM

Directeurs de thèse : Jean Gaudart & Jordi Landier

- **Le paludisme** : maladie infectieuse vectorielle causée par un parasite du genre *Plasmodium* et transmises par les moustiques du genre *Anopheles*
- **Sous-région du Grand Mékong :**
 - ➔ Important progrès réalisé pour la lutte contre le paludisme
 - ➔ Elimination *P. falciparum* en 2023 & toute forme en 2030
 - ➔ *P. falciparum* & *P. vivax* responsables de la majorité des cas et des décès liés au paludisme
 - ➔ Forte hétérogénéité spatiale

Figure 1. Carte des pays où le paludisme est endémique en fonction des objectifs GTS (incidence des cas de paludisme en 2020 par rapport à 2015). Source : estimation OMS – GTS: Global technical strategy for malaria 2016-2030.

Figure 2. Distribution of *P. falciparum* & *P. vivax* malaria cases in the GMS in 2021. Source : The Mekong Malaria Elimination Program, Bulletin March 2022.

- **Le paludisme forestier** : la transmission du paludisme est fortement associé aux activités dans les environnements forestiers
 - ➔ Interventions ciblées sur les personnes « allant en forêt »
 - ➔ **Peu probable que toutes les environnements forestiers et activités aient le même risque**
 - ➔ Dans ce contexte de pré-élimination, il y a besoin de ciblage des interventions et d'allocation de ressources à une échelle géographique fine

Est-ce que tous les environnements forestiers ont le même risque ?

- **Myanmar** : pays avec du paludisme dans les zones frontalières et montagneuses
- **Programme METF (Malaria Elimination Task Force)** :
 - ➔ Localisation : région Karen/Kayin située à la frontière avec la Thaïlande
 - ➔ Objectif : lancé en 2014 pour réduire la transmission de *P. falciparum*
 - ➔ Principe :
 - 1/ mise à disposition du diagnostique précoce et du traitement au niveau de « malaria posts » : test systématique des fièvres par TDR
P. falciparum-*P. vivax* → 95% ouvert en 2016
 - 2/ traitement de masse dans les villages de haute prévalence sous-microscopique

Quels types d'environnements forestiers et quels types d'activités humaines sont associés localement à une plus grande incidence ou persistance du paludisme à l'échelle du village ?

Figure 3. Carte de la région cible du programme METF et de l'état d'ouverture des malaria posts en décembre 2019 (n=1205).
Source : Malaria Elimination Task Force Activity Report Update May 2014 – December 2019

A. Outcome : Construction des profils d'incidence

- Data : incidence des cas de paludisme (*P. falciparum* & *P. vivax*) enregistrés par les malaria postes de 2016 à 2020 (n=662)
- Méthode : classification des villages par l'algorithme PAM associé à la métrique DTW sur données fonctionnelles

Données brutes : taux d'incidence hebdomadaire

Données fonctionnelles

Matrice de distance DTW

Profils d'incidence

① Lissage des séries chronologiques par transformation fonctionnelle

② Calcule distance DTW entre chaque village

③ Classification PAM

B. Covariables environnementales

Zone d'étude divisée en hexagones de 2km de largeur

Paysages

- **Données d'altitude et de pente** : GMTED 2010 digital elevation model
- **Couverture & occupation du sol** : classification réalisée par Florian Girond et Vincent Herbreteau, UMR ESPACE DEV
 - Image Sentinel 2 de 2019 à 2020 de haute résolution spatiale (10m à 60m) et temporelle (≈5 jours)
 - Méthode OBIA : object-based image analysis
 - Validation par une sélection de 300 points aléatoires du sol et photo-interprétation de Google Earth

Climat

- **Données de température** nuit/jour de Google Earth Engine : MODIS/006/MOD11A2 (1km résolution spatiale)
- **Données de pluviométrie** journalière de Google Earth Engine : UCSB-CHG/CHIRPS/DAILY (resolution 5.5 km)

A. Profiles d'incidence

→ 11 profils d'incidence identifiés pour *P. falciparum* et *P. vivax* distingués en fonction de leur amplitude, saisonnalité et tendance

B. Paysages & Climat

- Région recouverte à 74% de forêts (forêt clairsemée & forêt dense)
- 17 paysages identifiés à l'échelle de la région
- 2 paysages spécifiquement identifiés à l'échelle de la zone nord

→ Grande diversité de paysages forestiers identifiés dans une région montagneuse et forestière avec un gradient de « naturel » à anthropisé

Paysage à l'échelle de la région

Paysages à l'échelle de la zone Nord

Climat

C. Association entre les profils d'incidence et l'environnement

➔ Principalement 1 climat et 2 paysages associés aux profils d'incidence

Région

Zone Nord

P. falciparum

P. vivax

D. Zones éco-épidémiologiques

A. Echelle région vs. échelle zone nord pour *P. falciparum*

A)		METF region		Total
		Midland (N3)	Not in Midland (N2)	
North area	≤2km DSC; Midland (N3)	129 (19.5)	0 (0)	129 (19.5)
	≤2km DSC; Foothills (N4)	0 (0)	11 (1.7)	11 (1.7)
	>2km DSC (N5)	92 (13.9)	138 (20.8)	230 (34.7)
	Not in North area	56 (8.5)	236 (35.6)	292 (44.1)
Total		277 (42)	385 (58)	662 (100)

→ 4 profils de risque

B. Echelle région vs. échelle zone nord pour *P. vivax*

B)		METF region, 15 km			Total
		Midland, South Midland (N2)	Not in Midland, South Midland; <900m SG (N4)	Not in Midland, South Midland; >900m SG (N5)	
North area, 10 km	Not in Midland; <1.7km DSC (N3)	0 (0)	0 (0)	10 (1.5)	10 (1.5)
	Not in Midland; >1.7km DSC (N4)	0 (0)	5 (0.7)	134 (20.2)	139 (21)
	Midland; <2.5km DSC (N6)	132 (19.9)	0 (0)	0 (0)	132 (19.9)
	Midland; >2.5km DSC; <7.5km DSG (N8)	82 (12.4)	0 (0)	0 (0)	82 (12.4)
	Midland; >2.5km DSC; >7.5km DSG (N9)	7 (1.1)	0 (0)	0 (0)	7 (1.1)
	Not in North area	71 (10.7)	19 (2.9)	202 (30.5)	292 (44.1)
Total		292 (44.1)	24 (3.6)	346 (52.3)	662 (100)

→ 6 profils de risque

C. *P. falciparum* vs. *P. vivax*

C)		Pf	Not in Midland; >2km DSC	In Midland; >2km DSC	Foothills; <2km DSC	In Midland; <2km DSC
Pv	Not in Midland, South Midland; >900m SG; >1.7km DSC		335 (50.6) ^{Z7}	0 (0)	1 (0.15)	0 (0)
	Not in Midland, South Midland; <900 SG; >1.7km DSC		24 (3.6) ^{Z4}	0 (0)	0 (0)	0 (0)
	Not in Midland, South Midland; <1.7km DSC; >900m SG		0 (0)	0 (0)	10 (1.5) ^{Z2}	0 (0)
	In Midland, South Midland; >2.5km DSC; >7.5km DSG		15 (2.3) ^{Z5}	63 (9.5) ^{Z6}	0 (0)	0 (0)
	In Midland; <2.5km DSC		0 (0)	3 (0.45)	0 (0)	129 (19.4) ^{Z1}
	In Midland; >2.5km DSC; <7.5km DSG		0 (0)	82 (12.4) ^{Z3}	0 (0)	0 (0)

→ 7 zones éco-épidémiologiques

D. Zones éco-épidémiologiques

→ 7 zones éco-épidémiologiques avec différents profils d'incidence de paludisme et différentes population à risque

3. DISCUSSION

- Dans une région majoritairement forestière, grande diversité de paysages forestiers avec un gradient de « naturel » à anthropisé
- 1 climats et 2 paysages associés aux profils d'incidence principalement
- Autre étude sur les villages ayant uniquement reçu de la MDA : incidence post-MDA plus faible pour les villages à proximité du paysage mêlant de la forêt dense, clairsemée et des basses végétations
- 7 zones éco-épidémiologiques avec différentes profils d'incidence de paludisme et différentes population à risque
 - ➔ La forêt n'est pas un environnement homogène
 - ➔ Incite à prendre en compte dans la modélisation cette diversité d'environnement forestier
 - ➔ Intéressant pour le ciblage d'intervention et la planification de la surveillance

Factors associated with MDA impact

**Post MDA study PF incidence study:
Incidence follow-up= 4.2 years (range=2.6-6.6)
Clinical PF cases recorded=16 (range=0-171)**

Variable		Incidence Rate Ratio	95% CI	p.value
Climate	Warm hot season/midland	0.23	0.10-0.52	0.0004
Nearer Landscape Mountain valley	+1 km	1.36	1.00-1.85	0.052
Nearer Landscape Mountain side	+1 km	0.80	0.72-0.89	0.00004
Incidence in neighbouring villages 2 months before (5 weeks ma)	+1 case/1000/week	1.15	1.11-1.19	<10 ⁻⁶
Occurrence of ≥ 1 stock out at the malaria post in the previous month	Yes/No	1.51	1.26-1.82	0.00001
Additional mass intervention(s) conducted	Yes/No	0.30	0.21-0.42	<10 ⁻⁶
Time since MDA spline				<10 ⁻¹⁵

Results: factors associated with post-MDA PF incidence

Village effects: environment

Post-MDA management

Variable		Incidence Rate Ratio	95% CI	p.value
Climate	Warm hot season/midland	0.23	0.10-0.52	0.0004
Nearer Landscape Mountain valley	+1 km	1.36	1.00-1.85	0.052
Nearer Landscape Mountain side	+1 km	0.80	0.72-0.89	0.00004
Incidence in neighbouring villages 2 months before (5-week moving avg)	+1 case/1000/week	1.15	1.11-1.19	$<10^{-6}$
Occurrence of ≥ 1 stock out at the malaria post in the previous month	Yes/No	1.51	1.26-1.82	0.00001
Additional mass intervention(s) conducted	Yes/No	0.30	0.21-0.42	$<10^{-6}$
Time since MDA spline				$<10^{-15}$

s(week_since_mda; 5.84)

week_since_mda

Results: factors associated with post-MDA PF incidence

Rice paddies
River
Deforestation+
Build-up

*Pop. Density+
Connectivity?*

Altitude+
Steep+
Land. frag. -

*Remote?
Farms away
from the
village?*

CRF - Région – 10 km CRF - Zone Nord – 10 km

CIT - Région – 15 km

CRF - Région – 15 km

CIT – Zone Nord – 15 km

CRF – Zone Nord – 15 km